

Analiza mająca na celu ocenę ryzyka wystąpienia kanibalizmu u świń w gospodarstwie				
Występowanie obgryzania ogonów	Brak śladów obgryzania ogona	Ślady powierzchniowych ugryzień wzdłuż ogona	Na ogonie widoczna jest świeża krew i/lub obrzęk i objawy infekcji i/lub brakuje części ogona a na kikucie utworzył się strup	Uwagi np. nieprawidłowości dotyczą jednego kojca; nieprawidłowości we wszystkich kojcach w takim samym nasileniu
% świń				
nisko noszone ogony				
% świń				
zwiększona nerwowość zwierząt w stadzie				
% świń				
Rywalizacja w stadzie	Zachowania agresywne			
% świń				
Dostęp do wody	Liczba świń na 1 poidło	Wysokość montażu poidła		
Materiały wzbogacające	optymalne	suboptymalne	o marginalnym znaczeniu	Uwagi np. różnice pomiędzy kojcami;
rodzaj				
sposób podania				
częstość wymiany				
wykorzystanie materiałów wzbogacających	Ślady użytkowania	Obecność w kojcach materiałów w różnym stopniu zużycia	czystość materiałów wzbogacających	Uwagi
jakość materiałów wzbogacających	Maksymalne zachowania eksploracyjne	Średnie zachowania eksploracyjne	Minimalne zachowania eksploracyjne	Uwagi
czystość zwierząt	Do 30%	Powyżej 30%		uwagi

% świń				
Zdrowie				
kulawizna	brak	lekka	ciężka	uwagi
% świń				
objawy chorobowe	biegunka	Problemy oddechowe	zaczerwienienie spojówek	uwagi
% świń				
kondycja	dobra	zła		
% świń				

Wnioski

Czy istnieje ryzyko wystąpienia kanibalizmu u świń?

Jakie stwierdzono największe braki mogące doprowadzić do wystąpienia kanibalizmu?

Planowane działania:

Termin realizacji planowanych działań: